Ministerstwo Zdrowia

Opracowanie materiałów:
Państwowa Inspekcja Sanitarna

WZW TYPU A

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Choroba szerzy się głównie przez **brudne ręce** oraz drogą kontaktów seksualnych. Do zakażenia może dojść podczas spożycia zakażonej żywności lub wody.

„Żółtaczka pokarmowa"

Objawy grypopodobne oraz objawy ze strony układu pokarmowego:

- nudności, zgaga, wzdęcia,
- uczucie wczesnej sytości,
- ciemny mocz,
- zażółcenie skóry i białkówki oczu (żółtaczka).

Okres od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów

15 dni ▶ **50 dni**



Jak zapobiegać?

SZCZEPIENIE PRZECIW WZW TYPU A

SZCZEPIENIE ZALECANE, PŁATNE.



Skuteczność szczepienia przeciw wzw A oceniana jest na poziomie **98-99%.** Odporność po szczepieniu jest długotrwała, prawdopodobnie utrzymuje się całe życie.

Kogo warto zaszczepić?

- Pracowników służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, pracujących w wojsku,
- pracowników zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności,
- pracowników oczyszczalni ścieków, obsługi urządzeń kanalizacyjnych i innych mających kontakt z nieczystościami,
- dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież, która nie chorowała na wzw A,
- pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, zakażonym HIV,
- mężczyzn utrzymujących stosunki z mężczyznami.


Źródło: www.szczepienia.info

SALMONELLA

BAKTERIA WYWOŁUJĄCA CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

Do zakażenia dochodzi w momencie spożycia zakażonych **produktów lub wody.**

Bakterie Salmonella bytują zarówno w organizmie ludzi jak i zwierząt.



Objawy:

- bóle brzucha,
- wymioty,
- nudności,
- wodnista biegunka,
- gorączka (do 39 °C).

ok. 2500 odmian patogenu

Okres od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów

6 godzin ▶ **3-7 dni**

Jak zapobiegać?

Przestrzegać ogólnych zasad zapobiegania szerzenia się zakażeń jelitowych (higiena **rąk,** higiena przygotowywania i spożywania **posiłków**).

Źródło: www.szczepienia.info